Ruolo della Vitamina D sulle qualità delle performance

Elisa Folegatti

“Benessere, genetica e alimentazione della gallina ovaioia”

6 luglio 2021

NUTRITION · HEALTH · SUSTAINABLE LIVING

DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

Situazione attuale

Sistemi di allevamento (%) utilizzati in alcuni paesi

3

■ Gabbie ■ Voliera ■ Free range ■ Biologico

Database International Egg Commission

Effetto del sistema di allevamento sulla qualità del tessuto osseo durante la fase di pollastra

I nuovi sistemi di allevamento (cage-free) permettono alle pollastre e ovaiole di muoversi maggiormente, di esplorare l'ambiente e di utilizzare i posatoi, tali azioni sembrano esercitare un effetto positivo sulla qualità delle ossa

- I sistemi di allevamento hanno un effetto sullo sviluppo dei muscoli e sulle caratteristiche dello sterno (*Casey-Trott et al., 2017*)
- La densità ossea, la sezione dell'osso ed il contenuto minerale è maggiore nelle pollastre allevate in voliera rispetto all'allevamento in gabbia (*Casey-Trott et al., 2017*)

Resistenza alla rottura
misurata in tibie e omeri
di pollastre Lohmann
White di 16 sett
CC: Gabbie
AV: Voliera

Regmi et al., 2015

Keel Bone Damage – Deviazioni o fratture dello sterno

- Nonostante nei sistemi cage-free la resistenza ossea al carico di rottura sembra essere migliore, la mineralizzazione, in alcuni casi, sembra essere minore (Rodriguez-Navarro, 2018) infatti, le fratture, specialmente nella regione dello sterno sono di più (Toscano et al., 2020)
- Da report e studi effettuati in vari paesi (Belgio, Olanda, Danimarca, Svizzera, Inghilterra e Canada) le fratture e le deviazioni dello sterno variano dal 20 al 96%
- Le deviazioni/fratture dello sterno rappresentano anche un problema di benessere animale (dolore). Tale problematica incide anche sul consumo di magime (aumenta nel caso di lesioni)

Cause principali delle deviazioni/fratture dello sterno:

- Tardiva calcificazione dello sterno rispetto ad altre ossa
- Impatto violento verso strutture dell'allevamento, come i posatoi (sterno fragile → impatto → frattura)
- Altezza dei posatoi (disposizione di rampe può essere d'aiuto)

Effetto poco chiaro della nutrizione

Senza fratture 0

1

2

3

4

5

Lesione pronunciata

Attività giornaliera monitorata su 3 animali

Individui all'interno di un gruppo

Adattato da Rufener et al., 2018

Sviluppo del tessuto osseo dalla fase di pollastra ad inizio deposizione

Metabolismo della Vitamina D₃

Assorbimento intestinale: differenze tra vit D₃ e 25-OH-D₃

Gallina in condizioni normali

Gallina in condizione di stress (giovane, vecchia, sind. Malassorbimento, micotossicosi, stress...)

LUME
INTESTINALE

CELLULE
dell'EPITELIO

SANGUE

Vit D₃ Binding Protein (VDBP), trasportatori delle forme di vit D

FEGATO

Idrossilazione della 25-OH-D₃ nella forma (ormonale) attiva, la 1,25(OH)₂D₃

La produzione di 25-OH-D₃ varia in funzione dell'età degli animali

- La produzione endogena di 25-OH-D₃ diminuisce con l'età dell'animale
- Principali motivi:
 - ✓ Ridotto assorbimento della vit D₃
 - ✓ Riduzione dell'efficienza degli enzimi nel fegato (età e fatty liver)

Effetto negative sulla qualità del tessuto osseo e delle uova

Livelli plasmatici di 25-OH-D₃ in funzione della dieta e dell'età degli animali

Produzione di 25-OH-D₃ in relazione alla qualità del guscio

A= uova di BASSA qualità
B= uova di ALTA qualità

Effetto gruppo $P < 0.05$

Effetto della supplementazione con Hy•D[®] sulla crescita dell'osso nella pollastra (16 sett)

Bone Growth Rate (BGR) – Crescita dell'osso

Effetto della supplementazione con Hy•D® sullo sviluppo del tessuto osseo nella pollastra (17 sett)

Total Pore Volume – Volume totale dei pori

Spazio dei pori evidenziati nella parte corticale

- D, 2.760 IU vit D
- ▨ DD, 5.2200 IU vit D
- 25D, 2.760 IU vit D + 69mcg 25OHD3

Medullary cavity volume – Volume della cavità midollare

La supplementazione con Hy•D® ha determinato un aumento della dimensione dell'osso che può essere occupata da una percentuale maggiore di minerali

Effetto della supplementazione con Hy•D® sullo sviluppo del tessuto osseo nella gallina (60 sett)

Bone mineral content – Minerali nell'osso

Trabecular Bone connectivity – connessioni fra le trabecole

Trabecole ossee

D

DD

25D

Hy•D® nelle pollastre

Ossa di maggiori dimensioni

Aumento deposizione minerale

Miglior qualità del tessuto osseo

Effetto della supplementazione con Hy•D® sulla qualità delle uova

Prova commerciale di campo, Francia, 2020/2021

Formazione del guscio d'uovo

Prime fasi di mineralizzazione del guscio (fase iniziale 2 h)

Crescita dei cristalli (12 h)

Formazione del guscio d'uovo

- *Gusci dello stesso spessore possono avere proprietà differenti*

Crescita dei cristalli di calcite sul guscio

Solo i cristalli con direzione di crescita perpendicolare alla membrana crescono maggiormente

La crescita dei cristalli inizia
Competizione per lo spazio e la crescita

La matrice organica
determina:

- la **dimensione**
- la **forma**
- l'**orientamento**

dei cristalli di calcite.

La sua composizione
varia in funzione dell'età
dell'animale

Adattato da Gautron et al., 2021

Ruolo dell'Hy•D® sull'espressione delle proteine della matrice organica

L'espressione delle proteine della matrice organica, implicate nella biomineralizzazione del guscio, è influenzata dalla presenza di Hy•D® nella dieta

La supplementazione di Hy•D® nella dieta ha un'azione diretta sulla struttura e le proprietà meccaniche del guscio

Conclusioni

1. **Contesto.** La produzione di uova e la qualità del tessuto osseo delle pollastre e delle galline dipende da vari fattori: sistemi di allevamento, fisiologia degli animali, dal comportamento degli animali, dalla dieta, dalla genetica...
2. **Il livello plasmatico di 25-OH-D₃ (Hy•D®)** varia in funzione dell'età e della dieta degli animali e può essere utilizzato come indicatore "precoce" per monitorare la qualità della produzione
3. **Effetto dell'Hy•D® sul tessuto osseo:**
 - pollastra: aumento della dimensione dell'osso → aumento dello spazio per la deposizione di minerali
 - ovaia: deposizione minerale maggiore, miglior connessione delle trabecole → tessuto osseo di miglior qualità
4. Importanza della matrice organica nella formazione del guscio (struttura)
5. **Effetto dell'Hy•D® sull'espressione delle proteine della matrice organica** (proprietà meccaniche del guscio)

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.™